IMPLANTE SUBDÉRMICO

Levonorgestrel

Novedoso implante subdérmico 150mg de Levonorgestrel activo



Registro Sanitario Implante: 126M2021 SSA
Registro Sanitario Trocar: 1033E2021 SSA

IMPLANTE SUBDÉRMICO LEVONORGESTREL

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL USO DE FUERZA DE VENTAS DKT

IMPLANTE SUBDÉRMICO
Levonorgestrel

150mg de Levonorgestrel activo
2 varillas de elastómero de silicona
Trocar desechable
Medidas del dispositivo:
Blíster: 4 x 7.5 cm
Caja con 10: 8 x 3.5 x 13 cm
Individual: 5 x 1.5 x 13.6 cm
Registro Sanitario Implante:126M2021 SSA
Registro Sanitario Trocar: 1033E2021 SSA

Información clínica

- IMPLANTE LEVONORGESTREL es un conjunto de dos varillas flexibles, cilíndricas, selladas, de color blanco o blancuzco. Cada implante tiene 44 mm de largo y 2,4 mm en diámetro aproximadamente y contiene 75 mg de levonorgestrel, el ingrediente activo, haciendo un total de 150 mg.
- IMPLANTE LEVONORGESTREL funciona mediante una combinación de factores. Los más importantes de estos son la prevención de la liberación regular de óvulos y el engrosamiento del moco cervical, lo que dificulta que los espermatozoides lleguen al óvulo.
- La seguridad y eficacia de IMPLANTE LEVONORGESTREL han sido demostradas por 3 años de uso. Una vez que los implantes son insertados se pueden extraer a pedido de la usuaria en cualquier momento.
- IMPLANTE LEVONORGESTREL es uno de los métodos de anticoncepción reversibles más efectivos. Sin embargo, ningún anticonceptivo es 100 por ciento efectivo. La tasa promedio anual de embarazo de Levonorgestrel implante durante un periodo de 3 años es menos del 1%.
- Los IMPLANTE LEVONORGESTREL afectan el patrón de sangrado menstrual en la mayoría de las mujeres. Se ha reportado sangrado, irregular, prolongado e intermenstrual, manchado y amenorrea. En general, estas irregularidades disminuyen con el uso continuo.

Eventos adversos

- Dolor de cabeza
- Náusea
- Menstruación Irregular
- Aumento de Peso
- Enfermedad tromboembólica
- Sangrado vaginal inexplicado
- Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos o desconocidos

Por favor vea la Información de Prescripción para una lista completa de los eventos adversos.

Interacciones

El proveedor debe consultar la información de prescripción de los medicamentos concomitantes para identificar interacciones potenciales.

Embarazo

Los IMPLANTE LEVONORGESTREL deben quitarse en caso de embarazo durante el uso de Levonorgestrel implante Los estudios con animales han demostrado que las dosis muy altas de sustancias progestagénicas pueden causar masculinización de los fetos de sexo femenino. Los resultados de la mayoría de los estudios epidemiológicos hasta la fecha con exposición fetal inadvertida relevante a combinaciones de estrógeno y progestógenos indican ausencia de efecto teratogénico o fetotóxico. No hay ningún estudio disponible sobre el efecto de IMPLANTE LEVONORGESTREL durante o antes del embarazo.

Contraindicaciones

El uso de IMPLANTE LEVONORGESTREL es contraindicado para pacientes con:

- Hipersensibilidad al levonorgestrel o cualquier otro componente de Levonorgestrel implante
- Cáncer de mama actual (o antecedentes)
- Otra neoplasia dependiente de la hormona sexual diagnosticada o sospechada
- Enfermedad hepática grave, infección o tumor

Leche materna

Los niveles de levonorgestrel obtenidos con los implantes no afectan la calidad ni la cantidad de la leche materna. Madres dando de lactar pueden hacerse insertar implantes en cualquier momento entre el parto y los 6 meses postparto sin necesidad de un método de resguardo.

Consejería a la paciente

- IMPLANTE LEVONORGESTREL es un método de larga duración demostrado para 3 años de uso. Hasta que se desee quitar, no se requiere ninguna acción de la usuaria o seguimiento clínico de rutina luego de la inserción inicial.
- Luego de la extracción de las varillas, no hay retraso en el retorno a la fertilidad de la mujer. Las mujeres que discontinúen el uso de IMPLANTE LEVONORGESTREL pueden esperar tasas de embarazo comparables a las mujeres que no están usando un método anticonceptivo.
- IMPLANTE LEVONORGESTREL es adecuado para las mujeres que desean espaciar o limitar los partos.
- Cambios en patrones de sangrado pueden ocurrir con IMPLANTE LEVONORGESTREL consejería adecuada puede hacer más aceptables estos cambios.
- Revise detalladamente los riesgos, beneficios y efectos secundarios posibles, dando tiempo adecuado a las pacientes para hacer preguntas.

Volumetrías:

CAJA CON 10

(h) Altura: 13 cm
(l) Longitud: 8 cm
(w) Ancho: 3.5 cm



CAJA INDIVIDUAL

(h) Altura: 13.6 cm
(l) Longitud: 5 cm
(w) Ancho: 1.5 cm



7 502214 986505

1 pieza

IMPLANTE SUBDÉRMICO LEVONORGESTREL